

Calopsite

La calopsite tende al sovrappeso e alla selezione dei semi: una base formulata e vegetali vari riducono il rischio di carenze.

LA BASE QUOTIDIANA

Base bilanciata

Indicativamente 40–50% alimento formulato, 30–40% semi di qualità, 10–15% verdure e 5–10% frutta; adattare alla condizione corporea.

Verdure

Offrire quotidianamente ortaggi colorati e foglie scure, variando settimana per settimana.

Semi

Miglio, scagliola e avena in porzione misurata. Girasole e cartamo sono premi, non la base.

Acqua

Sempre pulita; sostituire immediatamente se contaminata da cibo.

Routine che fa la differenza

- Durante la conversione non eliminare bruscamente i semi: pesare ogni giorno.
- Favorire movimento e foraggiamento; adeguare le calorie ai soggetti sedentari.
- Rimuovere i cibi cotti o umidi entro circa un'ora.

Calopsite

CONSIGLIATI

- Peperone, broccoli, carota e zucca
- Cicoria, indivia, tarassaco e cavolo riccio
- Fagiolini, piselli e patata dolce ben cotti
- Alimento formulato per calopsite/piccoli pappagalli
- Semi in miscela varia e misurata

CON MODERAZIONE

- Frutti di bosco, melone, mela e pera senza semi
- Girasole, cartamo e frutta a guscio
- Mais: energetico
- Uovo cotto: solo per necessità specifiche

DA EVITARE

- Avocado, cioccolato, caffeina e alcol
- Cipolla, aglio e porro
- Semi di mela e noccioli
- Fagioli secchi crudi
- Cibi salati, grassi o zuccherati
- Dieta di soli semi e integratori casuali

Note pratiche

- Una calopsite può fingere di mangiare pellet: controllare peso e residui.
- Non confondere le bucce dei semi con alimento ancora disponibile.
- Il dimagrimento rapido o il rifiuto del cibo richiedono un veterinario aviario.

FONTI DI RIFERIMENTO

MSD Veterinary Manual — Management of Pet Birds · Association of Avian Veterinarians — Basic Care for Companion Birds · VCA Animal Hospitals — Cockatiels: Feeding